

Allgemeine und speziesspezifische Profile, Einzelanalysen



☐ NOTFALL

☐ VORBEFUND-NR.

Tierhalter Name: Vorname: Adresse:		Einsender (Stempel) E-Mail:																
Tier Tierart: Rasse: Geschlecht: Name: Alter: Nr: Rechnungstellung nur an Tierarzt oder Tierklinik / Preise in EUR zzgl. gesetz. MwSt. (monatl. Sammelrechnung)																		
Diagnose / Verdachtsdiagnose / Sympptome																		
Untersuchungsmaterial																		
entnommen am																		
<table border="0"> <tr> <td>☐ Serum</td> <td>☐ EDTA-Blut</td> <td>☐ Heparinblut</td> <td>☐ Blutausstrich</td> </tr> <tr> <td>☐ Vollblut</td> <td>☐ Heparinplasma</td> <td>☐ Citratplasma</td> <td>☐ Serum (in Cai/Mgi-Versandgefäß)</td> </tr> <tr> <td>☐ Serum gefroren</td> <td>☐ EDTA-Plasma stabilisiert (ACTH)</td> <td>☐ EDTA-Plasma gefroren</td> <td>☐ Fluorid-Blut</td> </tr> <tr> <td>☐ Urin</td> <td>☐ Kot</td> <td>☐ Sammelprobe</td> <td>☐ Abstrich von:</td> </tr> </table>			☐ Serum	☐ EDTA-Blut	☐ Heparinblut	☐ Blutausstrich	☐ Vollblut	☐ Heparinplasma	☐ Citratplasma	☐ Serum (in Cai/Mgi-Versandgefäß)	☐ Serum gefroren	☐ EDTA-Plasma stabilisiert (ACTH)	☐ EDTA-Plasma gefroren	☐ Fluorid-Blut	☐ Urin	☐ Kot	☐ Sammelprobe	☐ Abstrich von:
☐ Serum	☐ EDTA-Blut	☐ Heparinblut	☐ Blutausstrich															
☐ Vollblut	☐ Heparinplasma	☐ Citratplasma	☐ Serum (in Cai/Mgi-Versandgefäß)															
☐ Serum gefroren	☐ EDTA-Plasma stabilisiert (ACTH)	☐ EDTA-Plasma gefroren	☐ Fluorid-Blut															
☐ Urin	☐ Kot	☐ Sammelprobe	☐ Abstrich von:															

☐ Kleiner Blutstatus	Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten, Hb, Hkt, MCV, MCH, MCHC, Retikulozyten ☐ für Reptilien & Vögel	(1 ml EDTA-Blut) (Li-Hep-Blut)
☐ Großer Blutstatus	Kleiner Blutstatus + mikroskopische Leukozytendifferenzierung ☐ für Reptilien & Vögel	(1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausstriche) (Li-Hep-Blut)
☐ Allgemeines Profil	Alb, AP, Bili, Ca, Chol, Eiweiß, AST, ALT, γ-GT, K, Krea, Na, P, Glu, Hst, Fe	(0,5 ml Serum)
☐ Pankreasinsuffizienz	☐ Hund cTLI, Vit. B12, Folsäure ☐ Katze fTLI, Vit. B12, Folsäure	(1 ml Serum) (1 ml Serum)
☐ Spurenelemente	Fe, Cu, Zn, Ca, Mg, P, Eiweiß	(1 ml Serum)
☐ Leberprofil	Alb, AP, Bilirubin, Eiweiß, AST, ALT, γ-GT, GLDH, Gallensäuren	(0,5 ml Serum)
☐ Nierenprofil Serum	Alb, Ca, Cl, Eiweiß, Harnstoff, K, Kreatinin, Na, P, SDMA	(0,5 ml Serum)
☐ Nierenprofil Urin	Urinstatus, Urinsediment, Eiweiß/Kreatinin-Quotient	(5 ml Urin)
☐ Polyzythämie Profil	Allgemeines Profil + GBB, CRP, T4, Troponin I ³ , Erythropoetin ³	(EDTA-Blut + 2 Blutausstriche, 1 ml Serum)
☐ Herz Profil	CK, LDH, AST, Ca, Mg, K, Troponin I ³	(1,5 ml Serum)
☐ Hund/Katze Hypercalcämie 1	Allgemeines Profil + Ca ionisiert (0,7 ml Serum in Cai-Versandgefäß), PTH (0,5 ml Serum gefroren) ² , PTHrP ² (0,5 ml EDTA-Plasma/Serum gefroren)	
☐ Hund/Katze Hypercalcämie 2	Hund/Katze Hypercalcämie 1 (Material s.o.) + Calcitriol ²⁺⁵ (0,5 ml Serum gefroren und lichtgeschützt)	
☐ Hund/Katze Pankreatitis	PLI, ALT, Ca, Lipase, Amylase, Triglyzeride, Chol, AP, Bili, Ew, Alb, Glob, Na, K, Cl, Fruktosamin	(1 ml Serum)
☐ Hund/Katze Barf-Profil	ALT, Krea, Eiweiß, Alb, Ca, P, Cu, Zn, Vit A ³ , Calcidiol ³⁺⁵ , Vit E ³ , T4	(1,5 ml Serum gekühlt) Tier nüchtern
☐ Katzenprofil	Allgemeines Profil + Fe, Lipase, CK, GLDH, A/G-Q	(0,5 ml Serum)
☐ Katze Altersvorsorge	Gr. Blutstatus + Katzenprofil + Fruktosamin + SDMA + SAA + T4 + TSH (1 ml EDTA-Blut+2 Blutausstr.+0,5 ml Serum)	
☐ Katze FIP-Profil	FCoV-AK, Großer Blutstatus, Plasmaprotein, Alb, A/G-Q, Beurteilung	(1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausstriche)
☐ FIP-Profil + FeLV-AG	Katze FIP-Profil + FeLV-AG ☐ mit FIV-AK	(1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausstriche)
☐ Katze Respiratorisches Profil	PCR: FCV, FHV, B. bronchiseptica, M. felis, Chlamydien	(Trockener Tupfer)
☐ Hundeprofil	Allgemeines Profil + Amylase, CK, Fe, Lipase, Triglyzeride, GLDH	(0,5 ml Serum)
☐ Hund Altersvorsorge	Gr. Blutstatus + Hundeprofil + Fruktosamin + CRP + SDMA + TSH + T4 (1 ml EDTA-Blut + 2 Blutausstr. + 0,5 ml Serum)	
☐ Hund Schilddrüse 1	Gesamt-T4 (cT4), Thyreotropin (cTSH), cT4/cTSH-Quotient	(0,5 ml Serum)
☐ für Diagnostik	☐ für Therapiekontrolle (T4- Substitution)	
☐ Hund Schilddrüse 2	cT4, cTSH, cT4/cTSH-Quot., FT4, Thyreoglobulin-AK	(1,5 ml Serum)
☐ Hund Schilddrüse 3	cT4, cTSH, cT4/cTSH-Quot., rT3	(1,5 ml Serum)
☐ Hund Cushing Profil	Cortisol 2 x (DXM-Suppr. Low dose), endogenes ACTH, AP, AP (hitstab.)	(1,5 ml Serum)
☐ Hund Addison Profil	ACTH stim. (2 x Cortisol), Na, K, Cl, Ca, Hst, Krea, Glu	(1,5 ml Serum)
☐ Hund Respiratorisches Profil	PCR: CHV, CAV-2, CPiV, Influenza A-Virus, Staupevirus, B. bronchiseptica, Mykoplasmen	(Trockener Tupfer)
☐ Pferde-/Eselpfprofil	Allgemeines Profil + CK, Fe, Mg, GLDH, LDH, Triglyzeride	(1 ml Serum)
☐ Pferd/Eselpf Gesamtprofil	Pferde-/Eselpfprofil + Cu, Zn, SAA	(1,5 ml Serum)
☐ Pferd Respiratorisches Profil	PCR: EHV 1, EHV 4, Influenza A	(Trockener Tupfer)
☐ Rinderprofil	Ca, Mg, P, β-HBS, FFA, Hst, γ-GT, AST, GLDH, CK, LDH	(0,5 ml Serum)
☐ Wiederkäuer Festliegen	Ca, Mg, P, AST, CK, LDH	(0,5 ml Serum)
☐ Individualprofil	Parameter nach Tierarztwunsch gemäß Absprache	

Enzyme (Serum)	Hämatologie (EDTA/Heparin-Blut, Blutausstriche*)	Mykologie (Fell*, Hautgeschabsel*, Urin, Kot, Abstrich)
□ Amylase □ AP Alk. Phosphatase □ AP Alk. Phosphatase (hitze stabil 65°C): Hd □ CHE Cholinesterase □ CK Creatin-Kinase □ GLDH Glutamat-Dehydrogenase □ γ-GT Gamma-GT □ AST Aspartataminotransferase (GOT) □ ALT Alaninaminotransferase (GPT) □ LDH Laktatdehydrogenase □ Lipase-PS (Pankreas-spezifisch) □ PLI (pankreatische Lipase Immunreaktivität): Hund, Katze □ TLI (Trypsin-like immunoreact.): Hund □ TLI (Trypsin-like immunoreact.): Katze	□ Leukozyten-Differenzierung* □ Retikulozyten-Zahl + KM-Aktivität □ Hämatokrit	□ Mykologie □ Dermatophyten + Hefen* □ Dermatophyten PCR*
Metabolite, Vitamine (Serum)	Blutparasiten (Mikroskopisch-morphologischer Nachweis)	Infektionskrankheiten, Immunologie (Serum, Plasma, Liquor, EDTA-Blut*)
□ β-HBS β-Hydroxybuttersäure: Rind □ Bili Bilirubin gesamt □ Chol Cholesterin □ FFA Freie Fettsäuren: Rind □ Folsäure □ Fruktosamin: Hund, Katze □ Gallensäuren gesamt □ Glukose (Fluorid-Blut) □ Hst Harnstoff □ Krea Kreatinin □ SDMA Symmetrisches Dimethylarginin □ Triglyzeride □ Vitamin B12 □ Vitamin D: 1,25(OH)₂D (Calcitriol)²⁺⁵ □ Vitamin D: (25 OH) (Calcidiol)³⁺⁵ □ Vitamin A □ Vitamin E □ Coumarin-Aktivität (Vitamin-K/Vitamin-K-Epoxid-Verhältnis)	□ Babesien, Mykoplasmen, Ehrlichien, Anaplasmen, Mikrofilarien, Hepatozoon □ Knott-Test (Filarien-Nachweis nach Anreicherung aus 3 ml EDTA-Blut)	□ AGP (α1-saures Glycoprotein) FIP Monitoring □ Anaplasma phagocytophilum-AK (Suchtest) □ Anaplasma phagocytophilum-AK (Gesamt) □ Anaplasma phagocytophilum-AK (IgM/IgG) □ Antinukleäre Antikörper: Hund, Katze (Gesamt) □ Aspergillus-Nachweis (Galaktomannan) □ Babesia caballi- u. Babesia equi-AK (Gesamt) □ Babesia canis (ELISA) □ Bartonella henselae-AK (IgM/IgG): Katze □ Blutgruppenbestimmung*: Hund/Katze □ Borna-Virus-AK (Gesamt): Pferd □ Borrelia burgd.-AK, IFAT (IgM/IgG): Hund/Katze □ Borrelia burgd.-AK, Westernblot (IgM/IgG): Hund □ Borrelia burgd.-AK, Westernblot (IgM/IgG): Pferd □ Brucella canis-AK (IgM/IgG) □ Calicivirus-AK (IgM/IgG): Katze □ CAV-1-AK (HCC) (Neutralisationstest) □ Coggins-Test (EIA-Virus-AK), Einhufer (Serum) □ Coombs-Test (direkt)*: Hund, Katze □ Dirofilaria (D. Immitis)-AG □ EAV (Equine Arteritis-Virus)-AK (Neutralisationstest) □ Ehrlichia canis-AK (Gesamt) □ Ehrlichia canis-AK (IgM/IgG) □ EHV-1/EHV-4-AK (Neutralisationstest): Pferd □ Encephalitozoon cuniculi-AK (IgG) □ FeLV-AG □ FCoV-AK (FIP-Virus-AK) □ FIV-AK □ FIV-AK-Bestätigungstest (Westernblot) □ FCoV-AK, FIV-AK, FeLV-AG □ Herpes canis/felis-AK (IgM/IgG) □ IgA: Hund (Serum, Liquor) □ Influenza A Virus-AK □ Leishmania-AK (Gesamt): Hund □ Leptospira interrogans-AK (IgM/IgG): Hund □ Leptospira interrogans-AK (Gesamt): Pferd □ Neospora caninum-AK (Gesamt) □ Neospora caninum-AK (IgM/IgG) □ Panleukopenie-Virus-AG (Kot): Katze □ Parvovirose-Virus-AG (Kot): Hund □ Parvovirose-Virus-AK (IgG): Hund, Katze □ Rheumafaktoren (Waalser-Rose-Test) □ Rickettsia conorii-AK (IgM/IgG) □ Sarcoptes scabiei-AK (IgG): Hund □ Staupe-Virus-AK (IgM/IgG): Hund □ Toxoplasma gondii-AK (IgM/IgG): Hund, Katze □ Zeckenenzephalitis (FSME) Virus-AK (IgM/IgG)
Mineralstoffe, Spurenelemente (Serum)	Hormone, Medikamente (Serum, Urin*)	Nukleinsäure-Nachweis (PCR)
□ Ca Calcium □ Cai Ca ionisiert (Cai/Mgi-Versandgefäß) □ Cl Chlorid □ Cu Kupfer □ Fe Eisen □ J Jod □ K Kalium □ Mg Magnesium □ Mgi Mg ionisiert (Cai/Mgi-Versandgefäß) □ Na Natrium □ P Phosphor □ Cd Cadmium (EDTA-Blut) □ Cr Chrom (EDTA-Blut) □ Hg Quecksilber (EDTA-Blut) □ Pb Blei (EDTA-Blut) □ Mn Mangan □ Se Selen □ Zn Zink	□ ACTH, endogen (EDTA-Plasma stabilisiert)¹ □ AMH Anti-Müller Hormon (Serum gekühlt)³ □ Cortisol □ Cortisol 2x (ACTH-Stim.) Diagnostik □ Cortisol 2x (ACTH-Stim.) Therapiekontr. □ Cortisol 2x (DXM-Suppr., low dose) □ Cortisol 3x (DXM-Suppr., low dose) □ Cortisol 3x (DXM-Suppr., high dose) □ Cortisol/Kreatinin-Quotient* (Morgenerin von 1 Tag): Hund, Katze, Pferd □ Insulin: Hund, Katze, Pferd (Serum gekühlt)³ □ Östradiol □ Östronsulfat □ PMSG: Pferd, Esel □ Progesteron: Hund, Katze, Pferd □ PTH Parathormon (Serum gefroren)² □ PTHrP (EDTA-Plasma gefroren/Serum gefroren)² □ Testosteron □ T4: Hund, Katze, Pferd □ T4-Stimulation (□ TSH, □ TRH) □ TSH Thyrotropin: Hund, Katze □ fT4 freies T4 □ rT3 reverses T3 □ T3/T4-AK □ TGAK Thyreoglobulin-AK □ Bromid □ Digoxin □ Cyclosporin (EDTA-Blut) □ Phenobarbital	□ Angiostrongylus vasorum-DNA (EDTA-Blut, Kot) □ Anaplasma phagocytophilum-DNA □ Anaplasma platys-DNA □ B.canis gibsonii, microti, divergens-DNA (EDTA-Blut) □ Bartonella henselae-DNA (EDTA-Blut, Punktat) □ B. bronchiseptica PCR (Abstrich) □ Borrelia-burgd.(s.l.)-DNA (in Hautstanze, Punktat) □ Borrelia-burgdorferi (s.l.)-DNA in Zecke □ Chlamydia psittaci-PCR, Psittaciformes (3x Abstrich) □ Chlamydia spec.-DNA (Abstrich, Gewebe, Kot) □ Ehrlichia canis-DNA (EDTA-Blut, Punktat) □ Encephalitozoon cuniculi-DNA (Urin, Liquor) □ Giardia spec.-DNA (Kot) □ FCV-PCR (Abstrich) □ FCoV-RNA (1 ml EDTA-Blut, Punktat, Kot) □ FeLV-Provirus-DNA (EDTA-Blut) □ FHV-PCR (Abstrich ohne Medium) □ FIV-Provirus-DNA (EDTA-Blut) □ FSME-Virus (Liquor, Serum, Zecke) □ Leishmania spec.-DNA (Punktat, Haut, EDTA-Blut) □ Leptospira interrogans-DNA (Urin, EDTA-Blut) □ Hämatrope Mykoplasmen-DNA (EDTA-Blut) □ Neospora caninum-DNA (Liquor, Gewebe, Kot) □ Rickettsia spec.-DNA (EDTA-Blut, Punktat) □ Toxoplasma gondii-DNA (Liquor, Gewebe, Kot) □ Tritrichomonas foetus-DNA (Kot)
Urin (nativ/Zystozentese)	Proteine, Allergie-Test (Serum, EDTA-Plasma*)	Bakteriologie (Abstrich, Urin, Kot)
□ Gesamteiweiß quantitativ □ Spezifisches Gewicht □ Urinstatus □ Urinsediment □ Eiweiß/Kreatinin-Quotient □ Urineiweiß-Elektrophorese (nach Konzentrierung)	□ Albumin (chemisch) (Alb) □ Albumin/Globulin-Quotient □ Liquor-Gesamteiweiß (Eiweiß) □ Serum-Gesamteiweiß (Eiweiß) □ Serumeiweiß-Elektrophorese □ Plasmaprotein* □ Serum Amyloid A (SAA): Katze, Pferd, Rind □ C-reaktives Protein (CRP): Hund □ Troponin I (Serum gekühlt)³ □ Nt-proBNP(EDTA-Plasma gekühlt)*³: Hund, Katze □ Allergie-Komplettabklärung: Hund □ Allergie-Komplettabklärung: Katze □ Allergie-Komplettabklärung: Pferd	□ Bakt. US (Mikroskopie, Kultur, Differenzierung)^o □ Bakt. US Anaerob (anaerobe Kultur, Differenzierung)^o □ Bakt. US Urin (Keimzahl, Mikroskopie, Kultur)^o □ Bakt. US Milch/Viertel (Mikroskopie, Kultur, Differenzierung)^o □ Bakt. US Kot: Salmonellen, Yersinia, Campylobacter □ Bakt. US Kot (erweitert): Bakteriologie, Mykologie Salmonellen, Endoparasiten □ Bakt. US Kot (BARF): Salmonellen, Yersinien, Campulobacter, Listerien, Endoparasiten □ Zuchtthygiene Pferd I: Bakteriologie □ Zuchtthygiene Pferd II: Bakteriologie + Mykologie □ Urinkult Auswertung (Keimzahl, Differenzierung)^o □ jede weitere Keim-Differenzierung □ Antibiogramm (wenn erforderlich, je Keim in Verbindung mit bakteriologischer Untersuchung)
Kot (siehe auch spezielles Parasitologie-Formular)	Bakteriologie (Fell*, Hautgeschabsel*)	
□ Chymotrypsin □ Parasitenprofil (nach Flotation) + SAFC □ Lungenwurmlarven (Auswanderung) □ Okkultes Blut* □ Giardia duodenalis-AG □ Rotavirus-AG □ Strongyloiden-EpG (selekt. Entwurmung) □ Larvenkultur	□ Ektoparasiten*	
Verschiedenes		
□ Punktatanalyse (Bauchhöhle/Synovia + Ausstriche) □ Steinanalyse (IR-Spektroskopie) □ Zytologie (Ausstrichpräparate) □ Laktat (Fluorid-Blut) □ Nachweis freie Leichtketten im Urin (5 ml Urin) (Bence Jones Proteinurie)		
HINWEISE - PRÄANALYTIK:		
¹⁾ Es sind spezielle Stabilisator-Röhrchen bei Alomed verfügbar, andernfalls muss das EDTA Plasma gekühlt transportiert werden. ²⁾ Das Probenmaterial muss gefroren verschickt/transportiert werden, auf Anfrage besteht die Möglichkeit, einen Trockeneinsttransport zu bestellen (zusätzl. Abholgebühr) ³⁾ Gekühlt transportieren ⁴⁾ vor Testdurchführung mind. 5 Tage lang fleischlose Ernährung notwendig (Reis, Hüttenkäse, Quark) ⁵⁾ lichtgeschützt		